

## Рекомендации по применению гелевых удобрений GroGreen компании LIMA (Бельгия)

Культура	GROGREEN	Дозы	Период обработки
Зерновые колосовые	<b>GL STARTER + GL FRUIT</b>	2кг/га+2кг/га	Осенью в фазу лестницы для улучшения зимостойкости
	<b>GL VEGETATIVE</b>	3-5кг/га	В фазу кущения
	<b>GL VEGETATIVE</b>	3-5кг/га	В фазу выхода в трубку
Кукуруза, Подсолнечник, Соя	<b>GL STARTER</b>	3-4кг/га	Вместе с послевсходовым гербицидом
	<b>GL VEGETATIVE</b>	3-5кг/га	В фазе 5-7 листьев
Картофель	<b>GL STARTER</b>	3-5кг/га	В ранней фазе вегетации
	<b>GL VEGETATIVE</b>	4-5кг/га	Во время смыкания рядков
	<b>GL FRUIT</b>	4-5кг/га	В период цветение-созревание
Сахарная свёкла	<b>GL VEGETATIVE</b>	3-5кг/га	Начиная с фазы 4 листьев, вместе с обработками
	<b>GL VEGETATIVE</b>	3-5кг/га	При 50% смыкании
	<b>GL FRUIT</b>	3-5кг/га	При смыкании листьев в междурядьях
Овощи	<b>GL STARTER</b>	3-5кг/га	Через 2 недели после всходов/пересадки, повторная обработка с интервалом в 2 недели
	<b>GL VEGETATIVE</b>	3-5кг/га	В период активного вегетативного роста, вместе с химическими обработками, с интервалом 2 недели
	<b>GL FRUIT</b>	3-5кг/га	В период созревания, вместе с химическими обработками, с интервалом 2 недели
Виноград	<b>GL STARTER</b>	3-5кг/га	Первая обработка к моменту отрастания побегов. Повторная обработка с интервалом в 2 недели до цветения (не применять во время цветения).
	<b>GL VEGETATIVE</b>	3-5кг/га	После цветения с интервалом 2 недели, вместе с химическими обработками
	<b>GL FRUIT</b>	3-5кг/га	В период созревания ягод, с интервалом 2 недели
Плодоносящий сад	<b>GL STARTER</b>	3-5кг/га	За 2 недели до цветения. Повторная обработка за неделю до цветения (не применять во время цветения).
	<b>GL VEGETATIVE</b>	3-5кг/га	Через неделю после цветения, с интервалом 2 недели, вместе с хим. обработками
	<b>Кальциевая селитра Subtil CaN</b>	5-7кг/га	При наливе плодов вместе с химическими обработками (не смешивать с препаратами содержащими фосфор, серу)
	<b>GL FRUIT</b>	3-5кг/га	За месяц до уборки. Повторная обработка за 2 недели до уборки
Озимый рапс	<b>GL STARTER + GL BRASSICA</b>	2кг/га+2кг/га	В октябре во время интенсивного вегетативного роста в фазе 6-7 листьев
	<b>GL BRASSICA + GL VEGETATIVE</b>	3кг/га+2кг/га	Начало стеблевания
	<b>GL BRASSICA</b>	3-5кг/га	Начало бутонизации

**\*ПРИМЕЧАНИЕ:** следующие рекомендации используются как общее руководство. Всегда делайте поправку на планируемый урожай и местные почвенно-климатические условия